

ترامال ريتارد ١٠٠ ملغ

الترامادول هو مسكن ألم ينتمي لمجموعة من العلاجات التي تسمى الأفيونات يستخدم الترامادول لعلاج أنواع الألم المتوسطة إلى الشديدة. ولتسكين الألم لدى المرضى الذين يعانون من ألم مستمر، والذين يحتاجون إلى جرعات علاجية من المسكن على مدار اليوم

قد يسبب العلاج نوعاً من الإدمان في حال استخدامها بجرعات كبيرة أو لفترات طويلة، عندها يحتاج المريض إلى جرعات أكبر منه لتخفيف الألم بسبب اعتياد الجسم عليها

الاعراض الجانبية لترامال ريتارد

امساك - دوار - غثيان - صداع - نعاس - قيء - الاسهال - قلق - الهلوسة - عصبية - تخمة - حكة - جفاف الفم - تعرق
طفح جلدي - اكتئاب - صعوبة في التركيز - انزعاج - نقص ضغط الدم الانتصابي النوبات - الإغماء - ارتفاع ضغط الدم .
هبوط ضغط الدم - خفقان القلب - تسارع دقات القلب .

احتياطات استخدام ترامال ريتارد

- الرضاعة الطبيعية حيث ينصح بعدم استخدام الترامادول، لأنه يفرز في حليب الأم المرضع .
- الحمل، حيث أن الاستخدام المطول أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض الانسحابية عند الرضيع .
- الأطفال الأصغر من 16 سنة، حيث لم تثبت فعالية أو سلامة استخدام الترامادول في هذا الفئة العمرية .
- كبار السن، بسبب حساسيتهم الزائدة للأعراض الجانبية التي قد يسببها .
وتجدر الإشارة إلى أن الترامادول يعد من الأدوية التي تسبب الإدمان، يقسم إدمان الترامادول بخاصيتين أساسيتين، وهما

التعود

ويعني أن جرعة الترامادول المعتادة تتوقف عن إعطاء التأثير المطلوب مع الاستخدام المتكرر، مما يدفع المصاب بالإدمان لأخذ جرعات أكبر فأكبر من الدواء للحصول على الأثر ذاته .

الاعتماد

وهي أن الجسم يتأقلم مع وجود الترامادول عند الاستخدام المتكرر، مما يؤدي لأعراض انسحابية في حال التوقف عن أخذه

اعراض الترامادول الانسحابية

تظهر الأعراض الانسحابية على الشخص المدمن عند محاولته الإقلاع عن الإدمان، وقد تتداخل أعراض الانسحاب الناجمة عن الترامادول مع الأعراض الانسحابية للمواد المخدرة ومضادات الاكتئاب، وتشمل
التعرق الزائد - العطس - سيلان الأنف - تشنج العضلات - صعوبة النوم - الإسهال الشعور بالذعر - الهلوسة، وهو أمر نادر الحدوث
الم في المعدة - خدران في الأطراف .

أعراض ادمان الترامادول على الجهاز العصبي

قد يتسبب الترامادول في تثبيط للجهاز العصبي والجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس، الغيبوبة، الموت المفاجئ، الاكتئاب الحاد، الرغبة في الانتحار، القلق والتوتر من حين لآخر، ومن الأعراض الأخرى.
تقلبات مزاجية حادة وغير اعتيادية - العدوانية والغضب الزائد أو عدم تقدير الأمور بطريقة صحيحة- النعاس المفرط - صعوبة التركيز
العطاس المتزايد - التعرق المفرط - الرعشة والقشعريرة الباردة - الصداع .

اعراض ادمان الترامادول الجسدية

التقيؤ والغثيان - فقدان الشهية - جفاف الفم - حرقة المعدة .

اعراض ادمان الترامادول السلوكية

الاستخدام القهري للترامادول - الانسحاب الاجتماعي - إهمال النظافة - إهمال المسؤوليات العائلية والوظيفية والدراسية .

كيفية استخدام ترامال ريتارد

بعض النصائح الموصى باتباعها عند استخدام العلاج :

- يمكن تناول الترامادول مع الطعام إذا ما تسبب في اضطراب في المعدة .
- عند استخدام الأقراص ممتدة المفعول، يجب ابتلاعها كاملة، ويجب مراعاة أنها لا تمضغ، أو تكسر أو تسحق.
- عند استخدام الأقراص التي تذوب في الفم، توضع على اللسان حتى تذوب، ولا تحتاج لماء حتى تذوب .
- يسبب الترامادول النعاس ويمكن أن يؤثر على التركيز والحركة، لذلك يجب تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات أثناء استعمال هذا الدواء .
- لتجنب حدوث الدوخة، أو الدوار، أو الإغماء عند القيام من وضعية التمدد أو النوم يجب القيام من السرير ببطء، والاستراحة بوضع القدمين على الأرض لبضع دقائق قبل الوقوف .
- قد يسبب الترامادول إدماناً نفسياً أو جسدياً، بحيث يصبح من الصعب الاستغناء عنه .
- قد يسبب التوقف المفاجئ عن تناول الترامادول لدى المرضى الذين تناولوه لفترات طويلة أعراضاً معينة تسمى الأعراض الانسحابية، لذا ينصح بعدم التوقف عن تناول العلاج إلا بعد استشارة الطبيب وتحت إشرافه .
- قد يسبب تناول الجرعة الزائدة من الترامادول أعراضاً جانبية خطيرة، وقد تكون مميتة في بعض الأحيان، في حال تناول جرعة زائدة أو الشك في ذلك فيجب الاتصال مع الطبيب فوراً وأخذ المريض إلى أقرب مركز طوارئ .