



المركز الأردني للمعلومات الدوائية والسموم

JORDAN DRUG INFORMATION
AND TOXICOLOGY CENTER

نصائح وإرشادات عن كيفية إعطاء الدواء لطفلك

العلاجات السائلة



- اغسل يديك جيدا بالماء و الصابون قبل اعطاء العلاج السائل لطفك.



- رج العبوة جيدا قبل استخدامها.
- قس الكمية الصحيحة من العلاج بواسطة حقنة فموية يمكن الحصول عليها من الصيدليات.



- لا تستخدم ملاعق المطبخ في القياس لأنها ستعطيك كمية غير صحيحة من العلاج الواجب تناوله.



- تأكد من أن طفلك قد تناول الجرعة كاملة.
- يمكن أن تعطي طفلك كوبا من الحليب أو عصير الفواكة لشربه مباشرة بعد تناول علاجه لإخفاء طعم الدواء السائل.
- إذا لم يتمكن طفلك من أخذ الدواء بنفسه ، حتى مع تناول العصير بعده مباشرة، يمكنك التحدث مع طبيبك أو الصيدلي. قد ينجح باعطائك وسيلة لإخفاء طعم الدواء السائل عن طريق خلطها مع الحليب أو عصير الفاكهة مثلا، ولكن استشر دوما الطبيب أو الصيدلاني قبل القيام بذلك لأن هذه الطريقة قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع الأدوية.
- اضع جرعة من الدواء السائل إلى كوب من الحليب أو عصير الفاكهة (ويفضل في درجة حرارة الغرفة).
- تأكد من أن طفلك قد شرب المزيج كاملا.

- اضعف بعد ذلك كمية أخرى من العصير أو الحليب ، حركها جيدا وتأكد من أن طفلك قد تناولها كاملة.
- تأكد من تعليمات اعطاء الدواء من النشرة المرفقة به ، أو استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل مزج أو خلط العلاج وإعطائه للطفل.

➤ معلومات أخرى هامة

- عندما يصرف لطفلك وصفة جديدة تتضمن دواءً سائلاً، تأكد أولاً من قوة الدواء و الكمية الصحيحة من العلاج الواجب اعطائها لطفلك، بعض العلاجات السائلة يجب أن تحفظ بالثلاجة ، لذا تأكد بأنك تتبع التعليمات الصحيحة المرفقة مع العبوة، إذا لم تستطع فهم تلك التعليمات استشر الصيدلاني فيما يتعلق بذلك.
- بعض الأدوية التي تتوفر على شكل شراب سائل لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة بعد فتح العبوة، لذا يفضل أن تسجل تاريخ فتح العلاج على العبوة .





- يمكن أن يعطيك الصيدلاني حقنة فموية لقياس الكمية الصحيحة للعلاج قبل اعطائها لطفلك ، هذا سيساعدك لتتأكد بأن طفلك قد أخذ الجرعة الصحيحة من العلاج.
- بعض عبوات الأدوية قد تحتوي على مفرغة هواء تستطيع شرائها من الصيدليات ، التي يتم دفعها الى عنق العبوة.

تحضير الحقنة الفموية (التي تحتوي على مفرغة هواء)

- رج العبوة جيدا بعد التأكد من أن الغطاء محكم الإغلاق على العبوة.
- قم بإزالة الغطاء ، إذا لم تقم بعد بادخال مفرغة الهواء المطاطية ادفعها كاملة الى عنق العبوة.
- اسحب الجزء الخلفي من الحقنة الفموية، بحيث تصل الحلقة السوداء (التي تحدد كمية العلاج على العبوة) الى مستوى الدواء المسحوب داخل الحقنة الفموية.
- ادفع رأس الحقنة الفموية الى داخل مفرغة الهواء المطاطية.
- اقلب العبوة مع الحقنة الفموية رأسا على عقب.
- ادفع مفرغة الهواء ببطء للحقنة ، هذا سيدفع الهواء داخل الحقنة.
- بعد ذلك، قم بسحب مفرغة الهواء ببطء للخلف حتى تصل للحجم المطلوب من جرعة طفلك.
- اقلب العبوة كاملة مع الحقنة للوضعية الصحيحة واسحب الحقنة من العبوة.

تحضير الحقنة الفموية (بدون مفرغة هواء)

- رج العبوة جيداً، بعد التأكد أن الغطاء مثبت جيداً على العبوة.
- انزع الغطاء
- ثبت العبوة جيداً على سطح مستوي.
- ضع رأس الحقنة داخل فتحة العبوة (عبوة الدواء) بحيث يصل رأس الحقنة للعلاج السائل.
- اسحب مفرغة الهواء للخلف حتى تسحب الكمية الصحيحة من العلاج السائل داخل الحقنة الفموية.
- قد تحتاج لتثبيت العبوة بحيث يبقى رأس الحقنة في السائل وحتى تتمكن من سحب العلاج بدون سحب هواء لداخل الحقنة.

➤ اعطاء العلاج

- ضع طفلك في وضعية الوقوف أو الجلوس.
- ضع الحقنة في فم طفلك، بحيث يكون رأس الحقنة بجانب خده من الداخل.
- ادفع مفرغة الهواء للداخل ببطء، اعطي طفلك فرصة لبلع العلاج، لا تدفع المفرغة بسرعة حتى لا يخرج العلاج بسرعة وبالتالي تعريض طفلك للإختناق.

➤ بعد اعطاء العلاج

- اغسل الحقنة جيداً مستخدماً الماء والصابون، قم بسحب مفرغة الهواء عدة مرات أثناء ذلك حتى يتم غسلها جيداً بالماء والصابون، ثم قم بشطفها بالماء النظيف.
- إذا احتوت العبوة نفسها على مفرغة هواء، فمن الممكن ابقائها داخل عبوة العلاج دائماً.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بنا...

المركز الأردني للمعلومات الدوائية و السموم

الرقم المباشر: 06/ 5804524

رقم الهاتف : 65804804 / فرعي 66788-66787