

أقراص أوكسيكونتين (هيدروكلوريد أوكسيكودون) ممتدة المفعول ٢٠ ملغ

1. ما هي أقراص أوكسيكونتين وما هي استخداماتها

تم وصف هذا الدواء لك لتخفيف الآلام المتوسطة إلى الشديدة على مدى 12 ساعة. يحتوي على أوكسيكودون الذي ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى المواد الأفيونية، وهي "مسكنات للألم". تم وصف هذا الدواء لك ولا ينبغي إعطاؤه لأي شخص آخر. يمكن أن تسبب المواد الأفيونية الإدمان وقد تعاني من أعراض الانسحاب إذا توقفت عن تناوله فجأة.

٢. التحذيرات والاحتياطات

يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر إلى تقليل فعالية الدواء (تعتاد عليه، وهو ما يُعرف بالتحمل أو أعراض ما قبل الإدمان). يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للأوكسيكونتين أيضًا إلى الاعتماد عليها وإساءة استخدامها والإدمان، مما قد يؤدي إلى جرعة زائدة تهدد الحياة. يمكن أن يزداد خطر هذه الآثار الجانبية مع زيادة الجرعة وطول مدة الاستخدام. قد يجعلك الاعتماد أو الإدمان تشعر بأنك لم تعد تتحكم في كمية الدواء التي تحتاجها أو عدد مرات تناوله. يمكن أن يسبب الإدمان أعراض انسحاب عند التوقف عن تناول هذا الدواء. يمكن أن تشمل أعراض الانسحاب الأرق، وصعوبة النوم، والتهيج، والقلق، والشعور بنبضات قلبك (خفقان القلب)، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالغثيان أو الشعور به، والإسهال، وفقدان الشهية، والارتعاش.

٣. كيفية تناول أقراص أوكسيكونتين

- الجرعة المبدئية المعتادة للبالغون هي قرص واحد 10 ملغ كل 12 ساعة.
- لا تتجاوز الجرعة التي أوصى بها طبيبك.
- يجب عليك مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا. ابتلع الأقراص كاملة مع الماء. لا تسحقها أو تذوبها أو تمضغها.
- صُممت أقراص أوكسيكونتين للعمل بشكل صحيح على مدار 12 ساعة عند ابتلاعها كاملة. إذا تم كسر القرص أو سحقه أو إذابته أو مضغه، فقد يتم امتصاص الجرعة الكاملة لمدة 12 ساعة بسرعة في جسمك. قد يكون هذا خطيرًا، ويسبب مشاكل خطيرة مثل الجرعة الزائدة، والتي قد تكون قاتلة.
- يجب ألا يتناول الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الأقراص.
- إذا نسيت أن تأخذ جرعتك:
- إذا تذكرت خلال ٤ ساعات من وقت الجرعة، تناول الدواء فور تذكرك، أما إذا مر أكثر من ٤ ساعات ف تخطي الدواء لحين موعد الحبة التالية.
- إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول هذا الدواء، فناقش ذلك مع طبيبك أولاً. سيخبرك بكيفية القيام بذلك، عادةً عن طريق تقليل الجرعة تدريجيًا بحيث يتم تقليل أي آثار انسحاب مزعجة إلى الحد الأدنى.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

آثار جانبية شائعة جدًا قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص

- الإمساك
- الشعور بالغثيان أو الشعور به
- النعاس (يحدث هذا على الأرجح عند بدء تناول أقراصك أو عند زيادة جرعتك، ولكن من المفترض أن يزول بعد بضعة أيام.
- دوخة
- صداع
- حكة في الجلد.
- جفاف الفم، فقدان الشهية، عسر الهضم، ألم أو عدم الراحة في البطن، إسهال.
- ارتباك، اكتئاب، شعور بضعف غير عادي، رعشة، نقص الطاقة، تعب، قلق، عصبية، صعوبة في النوم، أفكار أو أحلام غير طبيعية.
- صعوبة في التنفس، الصفير، وضيق في التنفس.
- التعرق.

- قد يؤدي شرب الكحول أثناء العلاج بهذا الدواء إلى الشعور بمزيد من النعاس أو زيادة خطر الآثار الجانبية الخطيرة مثل التنفس الضحل مع خطر توقف التنفس وفقدان الوعي.
- يوصى بعدم شرب الكحول أثناء تناول أقراص أوكسي كودونتين.
- يجب تجنب شرب عصير الجريب فروت أثناء العلاج بهذا الدواء.
- تحتوي هذه الأقراص على اللاكتوز، وهو نوع من السكر. إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاستشر طبيبك قبل تناول هذه الأقراص.

هـ. الحمل والرضاعة الطبيعية

- لا تناولي أقراص أوكسيكودونتين إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً إلا إذا ناقشت هذا الأمر مع طبيبك وإذا كانت فوائد العلاج تفوق فوائده أثناء الحمل فقد يصبح طفلك معتمداً ويعاني من أعراض الانسحاب بعد الولادة والتي قد تحتاج إلى علاج.
- لا تتناولين أقراص أوكسيكودونتين أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث ينتقل الأوكسيكودونتين إلى حليب الثدي وسيؤثر على طفلك.