

أقراص سيفريدول ١٠ ملغ كبريتات المورفين

استخدامات أقراص سيفريدول:

تم وصف هذا الدواء لك لتخفيف الآلام الشديدة. يحتوي على المورفين، الذي ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى المواد الأفيونية، وهي "مسكنات للألم". التحمل، الاعتماد، والإدمان يحتوي هذا الدواء على المورفين، وهو دواء أفيوني. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للأفيونيات إلى تقليل فعالية الدواء (تعتاد عليه، وهو ما يُعرف بالتحمل).

يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر لأقراص سيفريدول أيضًا إلى الاعتماد، وإساءة الاستخدام، والإدمان، مما قد يؤدي إلى جرعة زائدة تهدد الحياة.

يمكن أن يزداد خطر هذه الآثار الجانبية مع زيادة الجرعة وطول مدة الاستخدام.

يمكن أن يجعلك الاعتماد أو الإدمان تشعر بأنك لم تعد تتحكم في كمية الدواء التي تحتاج إلى تناولها أو عدد مرات تناولها.

إذا لاحظت أيًا من العلامات التالية أثناء تناول أقراص سيفريدول، فقد يكون ذلك علامة على أنك أصبحت معتمدًا أو مدمنًا:

- تحتاج إلى تناول الدواء لفترة أطول من المدة التي نصحك بها طبيبك

- تحتاج إلى تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها

- تستخدم الدواء لأسباب أخرى غير الموصوفة، على سبيل المثال، "للحفاظ على هدونك" أو "مساعدتك على النوم"

- قمت بمحاولات متكررة وغير ناجحة للإقلاع عن استخدام الدواء أو التحكم فيه

- عندما تتوقف عن تناول الدواء، تشعر بتوعك، وتشعر بتحسن بمجرد تناول الدواء مرة أخرى ("آثار الانسحاب")

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فتحدث إلى طبيبك لمناقشة أفضل مسار علاجي لك، بما في ذلك الوقت المناسب للتوقف وكيفية التوقف بأمان.

- يمكن أن يسبب الإدمان أعراض انسحاب عند التوقف عن تناول هذا الدواء.

- يمكن أن تشمل أعراض الانسحاب الأرق، وصعوبة النوم، والتهيج، والانفعال، والقلق، والشعور بنبضات قلبك (خفقان القلب)، وارتفاع

ضغط الدم، والشعور بالغثيان، والإسهال، وفقدان الشهية، والارتعاش، والرغبة، أو التعرق.

- سيناقش معك طبيبك كيفية تقليل جرعتك تدريجيًا قبل إيقاف الدواء. من المهم ألا تتوقف عن تناول الدواء فجأة، لأن ستكون أكثر عرضة لأعراض الانسحاب.

- توقف عن استخدام أقراص سيفريدول واطلب العناية الطبية فورًا إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية: ظهور بثور، أو تقشر الجلد على نطاق واسع، أو بقع ملينة بالقيح مع الحمى.

- يمكن أن تسبب أقراص سيفريدول اضطرابات في التنفس مثل انقطاع النفس النومي ونقص تأكسج الدم المرتبط بالنوم.

الحمل والرضاعة الطبيعية

- إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين أنكِ حامل أو تخططين لإنتاج طفل، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

- لا تتناولي أقراص سيفريدول إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين أنكِ حامل إلا إذا ناقشتِ ذلك مع طبيبك وإذا كانت فوائد العلاج تفوق الضرر المحتمل على الطفل.

- لا تتناولي أقراص سيفريدول أثناء الرضاعة الطبيعية لأن المورفين ينتقل إلى حليب الثدي وسيؤثر على طفلك.

القيادة واستخدام الآلات

قد تسبب هذه الأقراص عدداً من الآثار الجانبية مثل النعاس الذي قد يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. عادةً ما تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً عند البدء في تناول الأقراص لأول مرة، أو عند التغيير إلى جرعة أعلى.

كيفية تناول أقراص سيفريدول

- ابتلع الأقراص كاملة مع كوب من الماء.

- يجب عليك تناول الأقراص عن طريق الفم فقط. لا ينبغي أبداً سحق الأقراص وحقتها لأن ذلك قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، والتي قد تكون قاتلة.

البالغون

الجرعة المبدئية المعتادة هي قرص واحد كل ٤ ساعات. سيقرر طبيبك عدد الأقراص التي يجب عليك تناولها.

الأطفال من ٣ إلى ٥ سنوات

الجرعة المعتادة هي ٥ ملغ كل أربع ساعات.

الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنة

الجرعة المعتادة هي ١٠-٥ ملغ كل أربع ساعات.

قد يشعر الأشخاص الذين تناولوا جرعة زائدة بالنعاس الشديد، أو الغثيان، أو الدوار، أو يصابون بالتهاب رئوي نتيجة استنشاق القيء أو المواد الغريبة (قد تشمل الأعراض ضيق التنفس، والسعال، والحمى). كما قد يعاني الأشخاص الذين تناولوا جرعة زائدة من صعوبات في التنفس تؤدي إلى فقدان الوعي أو حتى الوفاة.

إذا نسيت تناول أقراص سيفريدول

إذا فاتتك جرعة، فيجب عليك تناولها بمجرد أن تتذكرها، ثم تابع كما كان من قبل. لا تتناول جرعتين خلال ٤ ساعات. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض القرص المنسي.

لا تتوقف فجأة عن تناول هذا الدواء.

بكيفية القيام بذلك، عادةً عن طريق تقليل الجرعة تدريجيًا بحيث يتم تقليل آثار الانسحاب المزعجة إلى الحد الأدنى.

الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب هذه الأقراص آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تصيب الجميع.

- زيادة الحساسية للألم.
- انخفاض في حجم حدة العين.
- ضربات قلب سريعة أو بطيئة.
- ارتفاع ضغط الدم
- ألم شديد في أسفل البطن أو المثانة قد يأتي ويذهب.
- غياب الدورة الشهرية

أعراض الانسحاب

عند التوقف عن تناول أقراص سيفريدول، قد تعاني من أعراض الانسحاب من المخدرات، والتي تشمل الأرق، وصعوبة النوم، والتهيج، والانفعال، والقلق، والشعور بنبضات قلبك (خفقان القلب)، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالغثيان أو الشعور به، والإسهال، والارتعاش، أو التعرق.

كيف أعرف ما إذا كنت مدمنًا؟

- إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء لفترة أطول من المدة التي نصحك بها الطبيب.
- إذا كنت تشعر بالحاجة إلى استخدام جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها.
- إذا كنت تستخدم الدواء لأسباب أخرى غير الموصوفة.
- إذا كنت تشعر بتوسع عند التوقف عن تناول الدواء، ثم تشعر بتحسن بمجرد تناول الدواء مرة أخرى.
- إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن المهم أن تتحدث إلى طبيبك. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.