

سلفات المورفين كبسولات ٦٠ ملغ هذا الدواء يحتوي على المورفين، وهو من المواد الأفيونية (الأوبيويدية)

ما هي كبسولات المورفين ولأي غرض تُستخدم

يحتوي هذا الدواء على المورفين الذي ينتمي إلى فئة من الأدوية تُعرف باسم الأفيونات، وهي "مسكنات الألم" لتخفيف الألم الشديد، خاصة الألم المرتبط بالسرطان، خلال فترة تمتد حتى 12 ساعة، بفضل شكله ذو الإطلاق البطيء الخاص. تم وصف هذا الدواء لك فقط، ولا يجب إعطاؤه لأي شخص آخر. الأفيونات يمكن أن تسبب الإدمان، وقد تظهر عليك أعراض انسحاب إذا توقفت فجأة عن تناولها.

التحمل، والاعتماد، والإدمان

يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للمورفين إلى تقليل فعالية الدواء (تعتاد عليه، وهو ما يُعرف بالتحمل أو أعراض ما قبل الإدمان). يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر لكبسولات المورفين أيضًا إلى الاعتماد عليها وإساءة استخدامها والإدمان، مما قد يؤدي إلى جرعة زائدة تهدد الحياة. يمكن أن يزداد خطر هذه الآثار الجانبية مع زيادة الجرعة وطول مدة الاستخدام. قد يجعلك الاعتماد أو الإدمان تشعر بأنك لم تعد تتحكم في كمية الدواء التي تحتاجها أو عدد مرات تناولها. قد يُسبب الإدمان أعراض انسحاب عند التوقف عن تناول هذا الدواء. تشمل هذه الأعراض: الأرق، وصعوبة النوم، والتهييج، والانفعال، والقلق، والشعور بالضغط، والغثيان، والإسهال، وتسارع نبضات القلب (خفقان القلب)، وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الشهية، والارتعاش، والرعدة، والتعرق. سيناقش طبيبك معك كيفية تقليل الجرعة تدريجيًا قبل التوقف عن تناول الدواء. من المهم ألا تتوقف عن تناول الأدوية فجأة. ستكون أكثر عرضة لأعراض الانسحاب.

كيفية تناول كبسولات المورفين

ابتلع الكبسولات كاملة مع كوب من الماء. لا تكسرها أو تسحقها أو تمضغها.

صُممت كبسولات المورفين سلفات للعمل بشكل صحيح على مدار 12 ساعة عند ابتلاعها كاملة. إذا تم كسر كبسولة، أو تم سحق محتواها أو مضغه، فقد يتم امتصاص الجرعة الكاملة لمدة 12 ساعة بسرعة في جسمك. قد يكون هذا خطيرًا، ويسبب مشاكل خطيرة مثل الجرعة الزائدة، والتي قد تكون قاتلة.

يجب تناول كبسولاتك كل 12 ساعة. على سبيل المثال، إذا تناولت كبسولة في الساعة 8 صباحًا، فيجب عليك تناول الكبسولة التالية في الساعة 8 مساءً.

إذا كنت تواجه صعوبة في بلع الكبسولات، فيمكن رش محتويات الكبسولة بالكامل على ملعقة من الطعام شبه الصلب (مثل الزبادي العادي) وابتلاعها. لفتح الكبسولة، أمسكها في وضع مستقيم لاحتواء الحبيبات في الأسفل، ثم اضغط برفق على الجزء العلوي وقم بلفه لإزالتها، مع الحرص على عدم سكب المحتويات. لا تمضغ أو تسحق الحبيبات.

الجرعة المعتادة للبالغين هي كبسولة واحدة كل 12 ساعة.

قد يشعر الأشخاص الذين تناولوا جرعة زائدة بالنعاس الشديد أو المرض أو الدوار أو يصابون بالالتهاب الرئوي من استنشاق القيء أو المواد الغريبة. صعوبات في التنفس تؤدي إلى فقدان الوعي أو حتى الوفاة.

تقبض شديد في حدقة العين (انقباض حدقة العين)، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض في درجة حرارة الجسم، وغيبوبة.

ماذا تفعل إذا نسيت تناول كبسولات المورفين

- إذا تذكرت في غضون 4 ساعات من نسيان جرعتك، فتناول كبسولة على الفور. تناول جرعتك التالية في الوقت المعتاد.
- إذا تأخرت عن تناول جرعتك لأكثر من 4 ساعات، فیرجى الاتصال بطبيبك للحصول على المشورة. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.
- لا تتوقف فجأة عن تناول هذا الدواء، إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول هذا الدواء، فناقش ذلك مع طبيبك أولاً و سيخبرك بكيفية القيام بذلك، عادةً عن طريق تقليل الجرعة تدريجيًا بحيث يتم تقليل أي آثار انسحاب غير سارة إلى الحد الأدنى.

الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب كبسولات المورفين آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تصيب الجميع. توقف عن استخدام كبسولات المورفين واطلب العناية الطبية فورًا إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية

ظهور بثور، وتقشر الجلد على نطاق واسع، ويقع ملينة بالصدید، بالإضافة إلى الحمى. قد تكون هذه حالة تسمى الطفح الجلدي البشري الحاد المعمم (AGEP)

تحدث الأعراض عادةً خلال الأيام العشرة الأولى من العلاج. أخبر طبيبك إذا كنت قد أصبت بطفح جلدي شديد أو تقشير الجلد، أو ظهور بثور، أو تقرحات في الفم بعد تناول كبسولات المورفين أو غيرها من المواد الأفيونية.

آثار جانبية شائعة (قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص)

- الإمساك

- الشعور بالغثيان.

- النعاس الذي قد يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات .

هذا على الأرجح عند البدء في تناول الكبسولات لأول مرة أو عند زيادة جرعتك ولكن من المفترض أن يزول بعد بضعة أيام

- جفاف الفم، فقدان الشهية (فقدان الشهية)، ألم أو انزعاج في البطن

- القيء (الغثيان).

- الدوخة، والصداع، والارتباك، وصعوبة النوم

- شعور بضعف غير عادي

- شعور عام بالإعياء والتعب

- تقلصات عضلية لا إرادية

- طفح جلدي أو حكة في الجلد

- تعرق.

الحمل والرضاعة

لا تتناولي كبسولات المورفين إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين أنكِ حامل إلا إذا ناقشتِ ذلك مع طبيبك، وإذا كانت فوائد العلاج تفوق الضرر المحتمل على الطفل.

لا تتناولي كبسولات المورفين أثناء الرضاعة الطبيعية لأن المورفين ينتقل إلى حليب الثدي وسيؤثر على طفلك.