

ريفاكود باراسيتامول و هيمي هايدريت فوسفات الكومانيين

دواعي الاستعمال

يستعمل ريفاكود لتخفيف الآلام الخفيفة و متوسطة الحدة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

- البالغون :

هيمي هايدريت فوسفات الكودانين ١٠-٦٠ ملغ

باراسيتامول ٥٠٠-١٠٠٠ ملغ

- الجرعة اليومية القصوى ٨ أقراص ريفاكود

- الأطفال:

جرعة الكودانين في الأطفال هي عادة ٥.٠ ملغم / كغم

- ممكن تكرار الجرعة مرة كل أربع ساعات

البالغين جرعات أكبر من ٦٠ ملغم من الكودانين لا تقدم تخفيف للألم يتناسب مع الجرعة ولكن تؤدي الى اطالة فترة الشعور باختفاء الألم ويصاحب ذلك زيادة في احتمالية حدوث مضاعفات جانبية غير مرغوبة بتوقع حدوث ذات الشيء عند الأطفال.

المحاذير والاحتياطات

ينصح المرضى بعدم تجاوز أعلى جرعة يومية من باراسيتامول و هي ٤ غرام يوميا.

على المريض قراءة النشرات الداخلية للأدوية المصروفة بوصفة طبية أو تلك التي تصرف بدون وصفة طبية التأكد من عدم استخدام أكثر من دواء يحتوي على باراسيتامول.

الحمل والارضاع

الحمل

لا يوجد دراسات مناسبة للحوامل. يجب اعطاء أقراص باراسيتامول وكودانين خلال الحمل اذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين.

الإرضاع

باراسيتامول يظهر في حليب الام بكميات قليلة ولكن مدى أهمية أثرها على الرضيع غير معروفة.

يجب اعلام الامهات متى يجب عليهم مباشرة مراجعة العناية الطبية وكيف يتعرفوا على أعراض و علامات تسمم الوليد، مثل التخدير، صعوبة الرضاعة، صعوبة التنفس وانخفاض نبيرة الصوت في الطفل .

القدرة على قيادة المركبات أو التحكم بالآلات

قد يؤدي الكودانين الى خلل في القدرات أو الجسدية المطلوبة لإنجاز الوظائف مثل قيادة المركبات أو التحكم بالآلات، لذا يجب تجنبها خلال أخذ هذا العقار.

التأثيرات الجانبية

- أكثر أعراض جانبية ملاحظة كانت النعاس والدوار ، قصور في التنفس ، غثيان و القيء.

- تظهر هذه الأعراض أكثر في المرضى المتحركين وبعضها تخف عند الجلوس.

- في حالة حدوث أي آثار جانبية عند استخدام هذا الدواء يجب أن تقدم الجهات الصحية المختصة.

فرط الجرعة كودانين

تسمم الكودانين يتضمن ثلاثية الأفيون: تضيق بؤبؤ العين، تثبيط التنفس، وفقدان الوعي.

الباراسيتامول

على المرضى مراجعة الطبيب فوراً في حالة أخذ جرعة من الباراسيتامول أعلى من الجرعة الموصوفة أو في حالة حدوث تورم في الوجه والحلق وصعوبة في التنفس والحكة والطفح الجلدي.

جرعات التسمم (عند الكبار)

باراسيتامول ١٠ غرام

كودانين ٢٤٠ ملغ

معلومات إضافية للمريض

- لا تتوقف عن أخذ الدواء الموصوف لعلاج الألم الا اذا طلب منك الطبيب ذلك.

- قم بقراءة النشرات الداخلية للأدوية التي تحصل عليها بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية بتمعن.

- اسأل الصيدلي أن كان دواء الألم الموصوف لك يحتوي على باراسيتامول.

- لا تستخدم جرعة أعلى من تلك التي وصفها لك الطبيب من الأدوية المحتوية على باراسيتامول.

- لا تتناول المشروبات الكحولية أثناء استخدامك لأدوية محتوية على باراسيتامول.

توقف عن أخذ الدواء وراجع الطبيب فوراً في حالة:

- إذا أصبت بالحساسية مثل تورم في الوجه والفم والحلق وصعوبة في التنفس والحكة أو الطفح الجلدي.